

Nachsorgeschema Rektumkarzinom UICC-Stadium II und III

Nachsorgeprogramm Rektumkarzinom UICC-Stadium II und III

Name:	PATIENTENAUFKLEBER	Diagnose:	
Geburtsdatum:		Therapie/ Operation:	

Nachsorgetermine ¹								
Posttherapeutischer Monat	3	6	12	18	24	36	48	60
CEA, klinische Untersuchung		•	•	•	•	•	•	•
Sonographie ²	•			•		•	•	•
Coloskopie		• ³	•					• ⁴
CT Thorax Abdomen Becken		•	•		•			
Sigmoidoskopie/ Rektoskopie ⁵		•	•	•	•			

¹ Eine Nachsorge wird nur durchgeführt, wenn bei einem Rezidiv therapeutische Konsequenzen zu erwarten sind.

² Bei schlechter Beurteilbarkeit der Sonographie kann ein CT alle 6-12 Monate erwogen werden.

³ Falls präoperativ nicht vollständig erfolgt: Durchführung einer Koloskopie 3-6 Monate postoperativ. Dann Verzicht auf die Koloskopie in Monat 12.

⁴ Komplette Koloskopie anschließend alle 5 Jahre bis zu einem Alter von 75 Jahren

⁵ Nur wenn keine Exstirpation durchgeführt wurde bei Patienten mit erhöhtem Lokalrezidivrisiko: falls keine Radiochemotherapie durchgeführt wurde oder CRM+ oder EMVI oder cT4 oder cN2