



## Nachsorgebogen Kolonkarzinom (UICC II high risk + III)

(high risk = V1 o. G3 o. T4 o. Perforation o. < 10 LK)

<b>Name:</b>	Patientenaufkleber	<b>Diagnose:</b>	
<b>Geburtsdatum:</b>		<b>Therapie/Operation:</b>	

Nachsorgetermine																			
Monat nach Chemotherapie	3 <sup>2)</sup>	6 <sup>2)</sup>	9 <sup>2)</sup>	12 <sup>2)</sup>	15 <sup>2)</sup>	18 <sup>2)</sup>	21 <sup>2)</sup>	24 <sup>2)</sup>	30	36	42	48	54	60	72	84	120	180	240
Klinische Untersuchung	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	•	•			
CEA	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	•	•			
Sonografie-Abdomen	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	•	•			
Koloskopie	• <sup>1)</sup>			•										•			•	•	•

- 1) nur wenn präoperativ Abklärung des gesamten Kolons nicht durchgeführt wurde. Nachsorgeintervalle für CED-, FAP- und HNPCC-Patienten s. QMH-Darmzentrum (PBS Koloskopie DES.doc)
- 2) Nachsorge in den ersten 24 Monaten post adjuvanter Therapie am Klinikum, danach durch HA oder Gastroenterologen möglich