

Nachsorgeprogramm Rektumkarzinom UICC-Stadium II und III

Name:	PATIENTENAUFKLEBER	Diagnose:	
Geburtsdatum:		Therapie/ Operation:	

Nachsorgetermine ¹										
Posttherapeutischer Monat	3	6	12	18	24	36	48	60		
CEA, klinische Untersuchung		•	•	•	•	•	•	•		
Sonographie ²		•	•	•	•	•	•	•		
Coloskopie		• ³	•					• ⁴		
CT Thorax Abdomen Becken	•			•						
Röntgen Thorax			•		•	•	•	•		
Sigmoidoskopie/ Rektoskopie ⁵		•	•	•	•					

¹ Eine Nachsorge wird nur durchgeführt, wenn bei einem Rezidiv therapeutische Konsequenzen zu erwarten sind.
² Bei schlechter Beurteilbarkeit der Sonographie kann ein CT alle 6-12 Monate erwogen werden.
³ Falls präoperativ nicht vollständig erfolgt: Durchführung einer Koloskopie 3-6 Monate postoperativ. Dann Verzicht auf die Koloskopie in Monat 12.
⁴ Komplette Koloskopie anschließend alle 5 Jahre bis zu einem Alter von 75 Jahren
⁵ Nur wenn keine Exstirpation durchgeführt wurde bei Patienten mit erhöhtem Lokalrezidivrisiko: falls keine Radiochemotherapie durchgeführt wurde oder CRM+ oder EMVI oder cT4 oder cN2